



LABORATORIOS  
Salud Animal

# ANTIISTAMÍNICO

Registro No. : Q-7558-012  
Presentación: 20 mL y 100 mL  
Uso veterinario.  
Antihistamínico.  
Solución Inyectable.



## Fórmula

Cada 1 mL contiene:  
Clorhidrato de tripelenamina ..... 20 mg  
Vehículo c.b.p. .... 1 mL

## Indicaciones

**Bovinos (Productores de leche):** enfisema pulmonar, alergias alimentarias y digestivas, urticaria, infosura aguda, como estimulante central, en casos de debilidad posparto ocasionada por hipomagnesemia, hipocalcemia, fotosensibilización, toxemia, mastitis y metritis.

**Equinos:** enfisema pulmonar, alergias alimentarias, infosura aguda, dermatitis y fotosensibilización.

**Porcinos:** enfermedad de los edemas.

**Caninos:** otitis alérgica, alergias medicamentosas y dermatitis.

## Empleo y dosis

De 0.5 a 1.0 mg/Kg de peso o 1 mL/20 a 40 Kg de peso vivo, en caso necesario repetir la dosis cada 6 a 12 horas.

**Vía de administración:** intramuscular o subcutánea o intravenosa lenta.

## Advertencias

- Cuando se use la vía intravenosa, caliente previamente la solución a la temperatura corporal del animal.
- No usar el producto 4 días antes del sacrificio de los bovinos y porcinos.
- No usar para consumo humano la leche procedente de animales tratados con este producto hasta 24 horas después de la aplicación.
- No administrar en equinos destinados para consumo humano.
- No se deje al alcance de los niños.

Consulte al Médico Veterinario. Su venta requiere receta médica.