

LABORATORIOS
Salud Animal

ECTOSOL[®] CE

Registro No. : RSCO-PEC-INAC-0111-464-009-020
Presentación: 100 mL y 1 L
Cipermetrina. Butóxido de piperonilo.
Insecticida piretroide / concentrado emulsionable.

Fórmula

Ingrediente activo: P/P
Cipermetrina (+-) Alfa ciano (3-fenoxifenil)
(+)- cis/trans 3 - (2,2 dicloroetenil)-2,2
dimetil cilopropano carboxilato
(equivalente a 200 g de i.a/L a 20°C) 20%
Ingredientes inertes:
Butóxido de piperonilo
emulsificantes y solventes 10%

Indicaciones

Ectosol[®] CE es un insecticida y acaricida para uso pecuario, recomendado para utilizarse en instalaciones pecuarias como: corrales, establos, zahúrdas, gallineros, etcétera.

Contra plagas rastreras como: cucarachas, alacranes, arañas y escarabajos.

Contra insectos voladores como: moscas y mosquitos.

Ectoparásitos como: ácaros y pulgas en perro. Piojos en aves. Moscas en ovejas.

Empleo y dosis

Para insectos voladores y rastreos: aplique Ectosol[®] CE en todas las superficies, grietas, rendijas y puntos clave donde pasan, transitan o se esconden las plagas, tales como: paredes, techos, vigas, tubos, cobertizos, rincones y esquinas. Inspeccione los sitios donde proliferan los insectos o los lugares por los que entran a las instalaciones. Asperje un litro de la mezcla por cada 33 m².


Rastreos: 10 mL de Ectosol[®] CE por litro de agua.

Voladores: 5 mL de Ectosol[®] CE por litro de agua.

Contra ectoparásitos: asperje los animales con una suspensión de 2 mL de Ectosol[®] CE por litro de agua; para bañar por inmersión, use 1 mL de Ectosol[®] CE por litro de agua.

Se recomienda dar de 3 a 8 baños con un intervalo de 10 días, dependiendo de la severidad del caso. Durante el baño evite el contacto del producto con ojos y nariz de los animales.





LABORATORIOS
Salud Animal

ECTOSOL[®] CE

Registro No. : RSCO-PEC-INAC-0111-464-009-020
Presentación: 100 mL y 1 L

Advertencias

“ALTO LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

“NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO”.

“NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES”.

“MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS”.

“LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”.

“NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO”.

“NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL”.

“NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO”.

“EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA”

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación, consiga atención médica de inmediato. Retire a la persona intoxicada de la fuente de contaminación para evitar mayor contacto.

Contacto con los ojos: Lávese inmediatamente con abundante agua limpia, por lo menos durante 15 min.

Contacto con la piel: Lávese cuidadosamente con agua y jabón y quite a la persona intoxicada la ropa contaminada.

Contacto por ingestión: Si la persona está consciente, provoque el vómito inmediatamente, introduciendo un dedo en la garganta o administrando agua tibia salada. Si la persona está inconsciente asegúrese de que pueda respirar sin dificultad, no provoque el vómito y no trate de introducir absolutamente nada en la boca. Colóquelo en posición decúbito lateral izquierdo. Si el paciente no respira, comience de inmediato la respiración artificial. No dé respiración de boca a boca cuando el paciente haya tragado el producto o tenga contaminada la cara.

Contacto por inhalación: Si se presenta sobreexposición al producto por vía inhalatoria, retire a la persona intoxicada inmediatamente de la fuente de contaminación hacia una área con aire fresco. Si se produce dificultad al respirar o si el malestar persiste o si la persona está inconsciente, conseguir atención médica inmediatamente.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO

Grupo químico: Piretroides.

Antídoto: No se conoce un antídoto específico. Use tratamiento sintomático.

Tratamiento: En caso de ingestión del producto, deberá efectuarse un lavado gástrico. Lavar la boca con buches de agua y administrar carbón activado mezclado con agua (1 g por kg de peso), diluido en 300 mL de agua. No se administre leche o cualquier producto que contenga grasa.

Signos y síntomas de intoxicación: **Vía oral:** diarrea, salivación excesiva, náuseas y vómitos; falta de aliento y dificultad para respirar; temblores secundarios, hipersensibilidad a los estímulos externos y debilidad general. **Vía dérmica:** sensación de ardor y picazón después de la exposición, puede producir dermatitis. **Vía inhalatoria:** los efectos adversos más comunes producidos por inhalación son oclusión y secreción nasal y sensación de aspereza en la garganta. En las personas predispuestas, puede haber broncoespasmo, edema de mucosa oral, shock anafiláctico y neumonitis alérgica. Por inhalación masiva puede haber irritabilidad nerviosa, temblores y ataxia.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

“DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS”.

“MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT”.

“EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO”

“REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN”.

CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA:

ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS).

Uso veterinario. Consulte al Médico Veterinario antes de usar este producto.