



LABORATORIOS
Salud Animal

RATATÁN®

RSCO-PEC-RODE-0507-313-004-0.005

Presentaciones: Caja con 50 sobres de 25 g,
caja de 50 sobres de 75 g, 5 kg, 10 kg.

Fórmula

Bromadiolona..... 0.005 g
Excipiente c.b.p. 100.0 g

Indicaciones

Cebo rodenticida para el control de rata noruega, rata de los tejados y ratón doméstico. La bromadiolona es un rodenticida anticoagulante, más activo que los anticoagulantes convencionales de generaciones anteriores; actúa no sólo contra roedores susceptibles, sino también contra roedores resistentes a la hidroxycumarina. La bromadiolona de RATATÁN® se aproxima al rodenticida ideal, pues con una o dos ingestiones puede controlar el total de una población.

Empleo y dosis

Localice los sitios donde los roedores se alimentan, descansan, transitan o reposan. Coloque RATATÁN® cerca de estos lugares, directamente en las madrigueras, o cerca de los daños causados por los roedores, que por lo general se encuentran en lugares abandonados, matorrales y otros lugares donde pueden esconderse.

Antes de poner RATATÁN® deben limpiarse los lugares indicados de todo desperdicio y alimento que puedan comer los roedores.

Ratas: coloque de 25 a 50 g de RATATÁN® a intervalos de 5 a 10 m; reabastecer continuamente de cebo durante 10 días o hasta que los roedores no coman más.

Ratones: coloque un cebo de 25 g de RATATÁN® a intervalos de 3 a 5 m; reabastecer continuamente de cebo durante 15 días o hasta que los roedores no coman más.

El cebo contaminado o dañado debe reponerse de inmediato; para evitar reinfestaciones, limpie todo posible alimento, agua y material que puedan roer; si hay una reinfestación, repita el tratamiento con cebaderos permanentes y reemplace los cebos continuamente. Coloque los cebos en lugares inaccesibles para niños, mascotas o animales domésticos, o use estaciones rodenticidas (cajas de plástico o metálicas), con el fin de evitar un envenenamiento accidental; no ponga los cebos en lugares próximos a forrajes o alimentos y evite la posible contaminación..

Advertencias

- La bromadiolona es un anticoagulante de segunda generación. Si por accidente llega a ingerirse, administre vitamina K1 por vía intramuscular u oral, como se indica en la sobredosis por hidroxycumarina. Repítase si es necesario, basándose en el tiempo de coagulación.

Consulte al Médico Veterinario.

